

Feuille de TD n°5

Géométrie plane

1 Vecteurs et coordonnées

1.1 Colinéarité

1 Des bases

1. Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Dans chacun des cas suivants, déterminer si les vecteurs sont colinéaires.

(a) $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -6 \\ 9 \end{pmatrix}$

(b) $\vec{u} \begin{pmatrix} 15 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 7,5 \\ -1 \end{pmatrix}$

(c) $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ \frac{3}{5} \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{5} \\ \frac{6}{5} \end{pmatrix}$

2. Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Préciser si les points A , B et C sont alignés ou pas :

(a) $A(3; 4)$, $B(0; 2)$ et $C(-2; 1)$.

(b) $A\left(\frac{5}{4}; 3\right)$, $B\left(\frac{1}{2}; 4\right)$ et $C\left(\frac{1}{4}; \frac{13}{3}\right)$.

3. Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Déterminer les valeurs possibles du réel x de sorte que les vecteurs \vec{u} et \vec{v} soient colinéaires.


(a) $\vec{u} \begin{pmatrix} 2x+1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x \\ -1 \end{pmatrix}$

(b) $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ x \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 6-2x \\ x-1 \end{pmatrix}$

(c) $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1-2x \\ -1 \end{pmatrix}$

1.2 coordonnées

2



Décomposer chacun des vecteurs \vec{CT} , \vec{OX} , \vec{RD} et \vec{EM} dans les bases suivantes :

a. $(\vec{AB}; \vec{AH})$ b. $(\vec{AC}; \vec{AG})$ c. $(\vec{HO}; \vec{HN})$

3] On considère un triangle ABC non aplati. Dans chacun des cas suivants, exprimer les vecteurs \vec{u} et \vec{v} en fonction des vecteurs \vec{AB} et \vec{AC} puis indiquer s'ils sont colinéaires.

1. $\vec{u} = 2\vec{AB} + \vec{BC} - 3\vec{AC}$ et $\vec{v} = \frac{2}{3}\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{AC}$

2. $\vec{u} = 2\vec{AB} - \frac{2}{3}\vec{AC} + \vec{BC}$ et $\vec{v} = \frac{1}{2}(5\vec{AB} + 3\vec{AC}) - \frac{1}{2}\vec{BC}$


4] Dans un triangle ABC non aplati, on considère les points D , E , F et G définis respectivement par :

1. $3\vec{DB} + 7\vec{DC} = \vec{0}$

2. E est le milieu de $[AC]$

3. $3\vec{FB} + \vec{FA} = \vec{0}$

4. G est le symétrique de E par rapport à A .



On souhaite démontrer que les droites (ED) et (FG) sont parallèles.

1. En utilisant l'outil vectoriel

(a) Justifier que $\vec{CD} = \frac{3}{10}\vec{CB}$ puis que $\vec{AF} = \frac{3}{4}\vec{AB}$

(b) Exprimer, en utilisant la relation de Chasles, le vecteur \vec{FG} en fonction de \vec{AB} et \vec{AC} .

(c) Montrer, de la même façon, que $\vec{ED} = \frac{3}{10}\vec{AB} + \frac{1}{5}\vec{AC}$

(d) Conclure.

2. En utilisant un repère


(a) Déterminer les coordonnées des points A , B , C , E et G dans le repère $(A; \vec{AB}; \vec{AC})$.

(b) En exploitant les données de l'énoncé, calculer les coordonnées des points D et F .

(c) Conclure.

5 Recherche et exploitation d'un repère

Dans un triangle non aplati ABC , on considère le point D symétrique de B par rapport à C , E le milieu du segment $[AC]$ et F est tel que $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$.



En considérant un repère, démontrer que les points D , E et F sont alignés.

2 Équation de droite

2.1 Équation cartésienne

6 Soit d la droite d'équation cartésienne $5x - 3y + 1 = 0$

1. Déterminer un point et un vecteur directeur de la droite d . Tracer la droite dans un repère.
2. Le point $B(5; 7)$ appartient-il à la droite d ? Justifier.

7 Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$,

1. On considère la droite d d'équation $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$, où a et b sont des nombres réels non nuls. Déterminer les intersections de la droite avec les axes (Ox) et (Oy) .
2. Donner une équation cartésienne de la droite passant par $A(4; 0)$ et $B(0; 3)$.

8 Application : Concours des médianes d'un triangle

Soit ABC un triangle, I , J et K les milieux respectifs des côtés $[AB]$, $[BC]$ et $[CA]$. On se place dans le repère $\mathcal{R} = (A, \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC})$.

1. Déterminer les coordonnées des points de la figure dans le repère \mathcal{R} .
2. Déterminer les équations des médianes du triangle issues des sommets A et C .
3. Déterminer les coordonnées du point d'intersection G des deux médianes
4. Prouver que le point G appartient à la médiane issue de B .

9 Avec un paramètre

Soit m un réel. On considère la famille de droites \mathcal{D}_m d'équation :

$$x + (m - 1)y - m = 0.$$

1. Tracer dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ les droites \mathcal{D}_1 , \mathcal{D}_2 et \mathcal{D}_{-1} .
2. Démontrer que pour tout réel m , la droite \mathcal{D}_m passe par un point A dont on donnera les coordonnées.
3. (a) Peut-on trouver m tel que la droite \mathcal{D}_m passe par le point $B(3; 0)$?
(b) Peut-on trouver m tel que la droite \mathcal{D}_m soit parallèle à l'axe des ordonnées ?
(c) Peut-on trouver m tel que la droite \mathcal{D}_m soit parallèle à l'axe des abscisses ?

2.2 Représentation paramétrique

10

1. On considère la droite (d) caractérisée par le système paramétrique $\begin{cases} x = -5 + 2t \\ y = 4 - 3t \end{cases}$, avec $t \in \mathbb{R}$.
 - (a) Donner les coordonnées d'un point de la droite (d) et d'un vecteur directeur \vec{u} .
 - (b) En déduire une équation cartésienne de la droite (d) .
2. On considère la droite (d') d'équation cartésienne $-6x + 5y = 25$.
 - (a) Donner les coordonnées d'un point B de la droite (d') et d'un vecteur directeur
 - (b) En déduire une représentation paramétrique de la droite (d')
3. Déterminer les coordonnées du point d'intersection des deux droites (d) et (d') .

11 On considère les droites

$$(d_1): 4x - 3y = -16, (d_2): \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 10 - 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

$$(d_3): \begin{cases} x = 4 + 6t \\ y = 10 + 8t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

Déterminer les points d'intersections des droites non parallèles.

Dans le cas de parallélisme, préciser si les droites sont distinctes ou confondues.

3 Produit scalaire

3.1 Définition et propriétés

12 Démontrer qu'un triangle est rectangle

Démontrer que le triangle ABC est rectangle, avec $A(-1; -1)$, $B(-2; 1)$ et $C(3; 1)$.

13 Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On considère les points $A(2; \lambda)$, $B(1; 3)$ et $C(4; 3 - \lambda)$.

Déterminer les valeurs de λ pour lesquelles le triangle ABC est rectangle en B .

14 Médiatrices et concours

Rappel : La médiatrice d'un segment est l'ensemble des points équidistants des extrémités du segment.

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$, on considère les points $A(1; 6)$, $B(-3; 2)$ et $C(6; 1)$.

1. Équation de la médiatrice d_1 du segment $[AB]$

(a) Exprimer MA^2 et MB^2 en fonction de x et y .

(b) En déduire qu'une équation de la médiatrice de $[AB]$ est $x + y - 3 = 0$

2. Concours des médiatrices

(a) Déterminer de la même façon les équations des deux autres médiatrices.

(b) Montrer que les trois droites sont concourantes (sécantes au même point d'intersection).


(c) Comment s'appelle le point de concours des trois médiatrices ?

15 Calcul d'angle dans un repère

Dans un repère orthonormé, on donne : $A(-2; -1)$, $B(-3; 2)$ et $C(5; 4)$. Déterminer la mesure, arrondie au degré près, de l'angle \widehat{BAC} .

16 Loi des sinus

1. On se donne un triangle ABC :



Démontrer que l'aire du triangle ABC est égale à $S = \frac{1}{2}cb \sin(\widehat{A})$

2. En déduire la « Loi des sinus » :

$$\frac{a}{\sin(\widehat{A})} = \frac{b}{\sin(\widehat{B})} = \frac{c}{\sin(\widehat{C})}$$


17 Application

On donne ABC tel que $AB = 5\text{ cm}$, $\widehat{A} = 30^\circ$ et $\widehat{B} = 50^\circ$.

Faire un dessin.

Calculer BC et AC .

18 Soit $ABCD$ un quadrilatère convexe dont les diagonales se coupent en O , et soit α la mesure de l'angle \widehat{AOB}



Démontrer que l'aire de ce quadrilatère est égale à

$$S = \frac{1}{2}AC \times BD \times \sin \alpha$$

19 On considère un segment $[AB]$ de longueur 4. Quel est l'ensemble des points M du plan tels que $MA^2 + MB^2 = 20$?

20 $ABCD$ est un rectangle de centre O . Un point M est placé à l'intérieur du rectangle tel que $MA = 30\text{ cm}$, $MB = 18\text{ cm}$ et $MC = 6\text{ cm}$.

1. Faire une figure à main levée.

2. Démontrer que $MA^2 + MC^2 = MB^2 + MD^2$.

3. En déduire la longueur MD .

3.2 Vecteur normal à une droite

21 Dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}; \vec{j})$, on considère une droite $(d) : 3x - y = 1$ et un point $E(0; 1)$.

1. Vérifier que $E \notin (d)$

2. Déterminer la distance entre E et (d) .

4 Équation de cercle

22 Donner l'équation du cercle \mathcal{C} de centre $A(3; 4)$ et de rayon 5. Donner l'expression développée et réduite.

23 Discuter des ensembles de points suivants :

- Soit l'ensemble des points $M(x; y)$ vérifiant l'équation : $x^2 + y^2 + 6x - 2y + 8 = 0$
- Soit l'ensemble des points $M(x; y)$ vérifiant l'équation : $x^2 + y^2 - \frac{1}{2}x + y + 1 = 0$.

24 On considère le cercle \mathcal{C} d'équation $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$.

1. Déterminer le centre et le rayon de \mathcal{C} .
2. Le cercle \mathcal{C} coupe-t-il les axes de coordonnées ? Si oui, préciser en quels points.

25 On considère le cercle \mathcal{C} d'équation $x^2 + y^2 + 4x + 4y - 17 = 0$ et la droite (d) d'équation cartésienne $x - 2y + 3 = 0$.

Déterminer les éventuels points d'intersection entre le cercle \mathcal{C} et la droite (d) .

26 On considère le cercle \mathcal{C} de centre $A(3; 1)$, passant par l'origine du repère, et la droite (d) d'équation $x + y - 2 = 0$.

Déterminer les éventuels points d'intersection entre le cercle \mathcal{C} et la droite (d) .

Feuille de TD n°5

Réponses ou Solutions

1 Vecteurs et coordonnées

1.1 Colinéarité

1

1. **a.** oui **b.** non **c.** oui
 2. **a.** $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\det(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{BC}) = -1 \neq 0$, donc A, B et C ne sont pas alignés.

- b.** $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -3/4 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -1 \\ 4/3 \end{pmatrix}$ et $\det(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = 0$, donc A, B et C sont alignés.

- 3. a.** \vec{u} et \vec{v} colinéaires si et seulement si $\begin{vmatrix} 2x+1 & x \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = 0 \iff -2x - 1 - 3x = 0 \iff x = -\frac{1}{5}$.

b. $\begin{vmatrix} 4 & 6 - 2x \\ x & x - 1 \end{vmatrix} = 0 \iff 4x - 4 - 6x + 2x^2 = 0 \Delta = 36 > 0$, donc deux solutions : $\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = -1 \end{cases}$.

c. $\begin{vmatrix} 1/x & 1 - 2x \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 0 \iff -\frac{1}{x} - 1 + 2x = 0$ et si $x \neq 0$, $\iff -1 - x + 2x^2 \Delta = 9$, donc deux solutions : $\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -1/2 \end{cases}$

1.2 coordonnées

2

- a.** Base $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AH})$:

- $\overrightarrow{CT} = -4\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AH}$
- $\overrightarrow{OX} = 2\overrightarrow{AB} + 1\overrightarrow{AH}$
- $\overrightarrow{RD} = 0\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AH}$
- $\overrightarrow{EM} = 1\overrightarrow{AB} + 1\overrightarrow{AH}$

- b.** Base $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AG})$:

- $\overrightarrow{CT} = -1/2\overrightarrow{AC} + 3\overrightarrow{AG}$
- $\overrightarrow{OX} = 3/2\overrightarrow{AC} + 1\overrightarrow{AG}$
- $\overrightarrow{RD} = -1\overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AG}$
- $\overrightarrow{EM} = 1\overrightarrow{AC} + 1\overrightarrow{AG}$

- c.** Base $(\overrightarrow{HO}, \overrightarrow{HN})$:

- $\overrightarrow{CT} = -1\overrightarrow{HO} + 4\overrightarrow{HN}$
- $\overrightarrow{OX} = 3\overrightarrow{HO} - 2\overrightarrow{HN}$
- $\overrightarrow{RD} = -2\overrightarrow{HO} + 0\overrightarrow{HN}$
- $\overrightarrow{EM} = 2\overrightarrow{HO} - 1\overrightarrow{HN}$

3

1. $\vec{u} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} - 3\overrightarrow{AC} = 1\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$ et $\vec{v} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires.

2. $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ et $\vec{v} = 3\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$. On a $\vec{v} = 3\vec{u}$ et donc les vecteurs sont colinéaires.

- 4** Préliminaire : placement des points.

$$\begin{aligned} 3\overrightarrow{DB} + 7\overrightarrow{DC} &= \vec{0} \\ 3\overrightarrow{DB} + 7(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BC}) &= \vec{0} \\ 10\overrightarrow{DB} + 7\overrightarrow{BC} &= \vec{0} \\ \overrightarrow{BD} &= \frac{7}{10}\overrightarrow{BC} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3\overrightarrow{FB} + \overrightarrow{FA} &= \vec{0} \\ 3\overrightarrow{FB} + \overrightarrow{FB} + \overrightarrow{BA} &= \vec{0} \\ 4\overrightarrow{FB} + \overrightarrow{BA} &= \vec{0} \\ \overrightarrow{BF} &= \frac{1}{4}\overrightarrow{BA} \end{aligned}$$

\overrightarrow{CD} :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{CD} &= \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BD} \\ \overrightarrow{CD} &= \overrightarrow{CB} - \frac{7}{10}\overrightarrow{CB} \\ \overrightarrow{CD} &= \frac{3}{10}\overrightarrow{CB}\end{aligned}$$

\overrightarrow{AF} :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AF} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} \\ \overrightarrow{AF} &= \overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{AF} &= \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}\end{aligned}$$

2. Expression des vecteurs \overrightarrow{FG} et \overrightarrow{ED} en fonction des vecteurs \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AC} .

Cela est possible car les vecteurs \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AC} ne sont pas colinéaires (sinon les points A , B et C seraient alignés et le triangle ABC aplati).

$$\begin{array}{l|l|l} \overrightarrow{FG} = \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{AG} & \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{CD} & \text{On remarque que :} \\ \overrightarrow{FG} = -\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} & \overrightarrow{ED} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{3}{10}\overrightarrow{CB} & -\frac{1}{2} \times \left(-\frac{2}{5}\right) = \frac{1}{5} \\ & \overrightarrow{ED} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{3}{10}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}) & -\frac{3}{4} \times \left(-\frac{2}{5}\right) = \frac{3}{10} \\ & \overrightarrow{ED} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AC} + \frac{3}{10}\overrightarrow{AB} & \left. \begin{array}{l} \overrightarrow{ED} = -\frac{2}{5}\overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{ED} = \frac{3}{10}\overrightarrow{AC} \end{array} \right\} \end{array}$$

Ainsi les vecteurs \overrightarrow{ED} et \overrightarrow{FG} sont colinéaires et par conséquent, les droites (ED) et (FG) sont parallèles.

PARTIE II

RÉSOLUTION EN UTILISANT UN REPÈRE

Dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC})$, on a rapidement :

$$A(0; 0) \quad B(1; 0) \quad C(0; 1) \quad E\left(0; \frac{1}{2}\right) \quad G\left(0; -\frac{1}{2}\right)$$

Pour le point F , on a prouvé plus haut que $\overrightarrow{AF} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$, ainsi, $F\left(\frac{3}{4}; 0\right)$.

Pour le point D , il faut bricoler un peu :

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{3}{10} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{10} \\ \frac{7}{10} \end{pmatrix}$$

Ainsi, $D\left(\frac{3}{10}; \frac{7}{10}\right)$.

Dans ce repère, $\overrightarrow{ED} \begin{pmatrix} \frac{3}{10} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{7}{10} \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{GF} \begin{pmatrix} \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, on calcule ainsi le déterminant :

$$\det(\overrightarrow{ED}; \overrightarrow{GF}) = \begin{vmatrix} \frac{3}{10} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{7}{10} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{3}{20} - \frac{3}{20} = 0$$

Donc \overrightarrow{ED} est colinéaire à \overrightarrow{GF} et donc les droites (ED) et (GF) sont parallèles.

5 Dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$, les coordonnées des points de la figure sont les suivants :

$$A(0; 0) \quad B(1; 0) \quad C(0; 1) \quad E\left(0; \frac{1}{2}\right) \quad F\left(\frac{1}{3}; 0\right) \quad D(-1; 2)$$

Pour les coordonnées de D , on exprime \overrightarrow{AD} en fonction de \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AC} :

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + 2(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) = -1\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$$

On a donc les vecteurs $\overrightarrow{DE} \begin{pmatrix} 1 \\ -3/2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{DF} \begin{pmatrix} 4/3 \\ -2 \end{pmatrix}$. On a

$$\begin{vmatrix} 1 & 4/3 \\ -3/2 & -2 \end{vmatrix} = -2 + \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} = 0$$

Donc les points D , E et F sont alignés.

2 Équation de droite

2.1 Équation cartésienne

6

- Le point $A(1; 2)$ appartient à la droite (d) car $5 \times 1 - 3 \times 2 + 1 = 0$. Un vecteur directeur est $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ -5 \end{pmatrix}$ ou $\vec{u}' \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$.
- Le point $B(7; 5)$ n'appartient pas à la droite d car $5 \times 5 - 3 \times 7 + 1 = 0$.

7

- $A(a; 0)$ et $B(0; b)$ sont les intersections avec les axes de coordonnées.
- Une équation de la droite passant par $A(4; 0)$ et $B(0; 3)$ est donc $\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1 \iff 3x + 4y = 12$.

8

- Coordonnées dans le repère \mathcal{R} :

$$A(0; 0) \quad B(1; 0) \quad C(0; 1) \quad I\left(\frac{1}{2}; 0\right) \quad J\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right) \quad K\left(0; \frac{1}{2}\right)$$

Équation de (AJ) : $\vec{AJ} \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur et $M(x; y) \in (AJ) \iff \vec{AM}$ et $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ sont colinéaires

$$\iff \begin{vmatrix} x & 1 \\ y & 1 \end{vmatrix} = 0 \iff x - y = 0$$

Équation de (CI) : $\vec{CI} \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur et $M(x; y) \in (CI) \iff \vec{CM}$ et $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ sont colinéaires

$$\iff \begin{vmatrix} x & 1 \\ y - 1 & -2 \end{vmatrix} = 0 \iff -2x - y + 1 = 0$$

L'intersection des médianes est donc le point de coordonnées (x, y) vérifiant le système :

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ -2x - y + 1 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = y \\ 2x + x = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1/3 \\ y = 1/3 \end{cases}$$

- La médiane issue de B a pour équation $x + 2y - 1 = 0$ et les coordonnées de G vérifient bien l'équation de la droite, ainsi, G appartient bien à la troisième médiane.

Cela prouve que les médianes d'un triangle sont concourantes.

9

- On trace les droites d'équations $x = 1$, $x + y - 2 = 0$, $x - 2y + 1 = 0$
- Résolvons le système

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ x - 2y = -1 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y = 2 \\ 3y = 3 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$$

Il est clair que le point $A(1; 1)$ appartient aux trois droites \mathcal{D}_1 , \mathcal{D}_2 et \mathcal{D}_{-1} .

Soit $m \in \mathbb{R}$, $1 + (m - 1) \times 1 - m = 1 + m - 1 - m = 0$, donc les coordonnées de A vérifient l'équation de la droite \mathcal{D}_m quel que soit $m \in \mathbb{R}$.

On en conclut que toutes les droites \mathcal{D}_m sont concourantes en A .

- (a) $3 + (m - 1) \times 0 - m = 0 \iff m = 3$, donc \mathcal{D}_3 passe par $B(3; 0)$.
- (b) Un vecteur directeur de \mathcal{D}_m est $\vec{u}_m \begin{pmatrix} 1 - m \\ 1 \end{pmatrix}$, il sera colinaire avec l'axe des ordonnées si et seulement si $m = 1$.
- (c) Un vecteur directeur de \mathcal{D}_m est $\vec{u}_m \begin{pmatrix} 1 - m \\ 1 \end{pmatrix}$ qui ne peut pas être colinaire avec $\vec{i} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

2.2 Représentation paramétrique

3 Produit scalaire

3.1 Définition et propriétés

[12] $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, on a $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -1 \times 4 + 2 \times 2 = 0$ donc les vecteurs \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AC} sont orthogonaux et donc le triangle ABC rectangle en A .

[14]

1. Équation de la médiatrice (d_1)

a. $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x-1 \\ y-6 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BM} \begin{pmatrix} x+3 \\ y-2 \end{pmatrix}$ donc $AM^2 = (x-1)^2 + (y-6)^2$ et $BM^2 = (x+3)^2 + (y-2)^2$.

b.

$$\begin{aligned} MA^2 &= MB^2 \\ (x-1)^2 + (y-6)^2 &= (x+3)^2 + (y-2)^2 \\ -8x - 8y + 24 &= 0 \\ x + y - 3 &= 0 \end{aligned}$$

Ainsi, $M(x; y) \in d_1 = \text{Md}([\text{AB}]) \iff x + y - 3 = 0$

2. Cercle circonscrit

a. $\overrightarrow{CM} \begin{pmatrix} x-6 \\ y-1 \end{pmatrix}$ donc $CM^2 = (x-6)^2 + (y-1)^2$ et

$$\begin{aligned} MA^2 &= MC^2 \\ (x-1)^2 + (y-6)^2 &= (x-6)^2 + (y-1)^2 \\ 10x - 10y &= 0 \\ x - y &= 0 \end{aligned}$$

Ainsi, $M(x; y) \in d_2 = \text{Md}([\text{AC}]) \iff x - y = 0$

b. Le centre Ω du cercle circonscrit appartient aux deux médiatrices, ainsi, ses coordonnées sont solution du système :

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x = 3 & (L_1 + L_2) \\ x = y & \end{cases} \iff \Omega \left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2} \right)$$

[15] On calcule le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 8$, puis, en utilisant la formule d'Al-Kashi, on trouve :

$$\cos \widehat{A} = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{\|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\|} = \frac{8}{\sqrt{10} \times \sqrt{74}} = \frac{4}{\sqrt{185}}$$

[16]

1. D'après la formule classique de l'aire d'un triangle, $S = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{1}{2}c \underbrace{b \sin \widehat{A}}_{\text{hauteur issue C}}$

2. Par permutation circulaire, on obtient les formules équivalentes :

$$S = \frac{1}{2}bc \sin \widehat{A} = \frac{1}{2}ca \sin \widehat{B} = \frac{1}{2}ab \sin \widehat{C}$$

Puis on divise toutes les fractions par $\frac{abc}{2}$ et on obtient la loi des sinus.

$$\frac{a}{\sin(\widehat{A})} = \frac{b}{\sin(\widehat{B})} = \frac{c}{\sin(\widehat{C})}$$

17 $\frac{a}{\sin 30} = \frac{b}{\sin 50} = \frac{5}{\sin 100}$

18 $S = \mathcal{A}_{AOB} + \mathcal{A}_{BOC} + \mathcal{A}_{COD} + \mathcal{A}_{DOA}$ Puis on utilise $S = \frac{1}{2}cb \sin(\widehat{A})$ sachant que $\widehat{BOC} = \pi - \alpha$ et que $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$, on a :

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \sin \alpha (OA \times OB + OB \times OC + OC \times OD + OD \times OA) \\ &= \frac{1}{2} \sin \alpha (OB \times (OA + OC) + OD \times (OC + OA)) \\ &= \frac{1}{2} \sin \alpha (AC \times (OB + OD)) \\ &= \frac{1}{2} \sin \alpha AC \times BD \end{aligned}$$

19 On sait, d'après le théorème de la médiane, que pour tout point M , on a $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2$, où I est le milieu de $[AB]$.

Ainsi, on a $2MI^2 = 20 - \frac{1}{2} \times 4^2 = 12 \iff MI = \sqrt{6}$. L'ensemble des points recherchés est donc le cercle de centre I et de rayon $\sqrt{6}$.

20

1. Dans un rectangle, les diagonales sont de même longueur et ont même milieu. Donc $AC = BD$ et O est le milieu commun.

Par ailleurs, d'après le théorème de la médiane, $MA^2 + MC^2 = 2MO^2 + \frac{1}{2}AC^2$ et par ailleurs, $MB^2 + MD^2 = 2MO^2 + \frac{1}{2}BD^2$. D'où la relation, $MA^2 + MC^2 = MB^2 + MD^2$.

2. $MD^2 = 30^2 + 6^2 - 18^2 = 612$, donc $MD = 6\sqrt{17}$

3.2 Vecteur normal à une droite

21

1. les coordonnées de E ne vérifient pas l'équation de d .

2. Un vecteur normal à d est $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$.

(a) Une équation de la perpendiculaire à d passant par E peut-être définie par $\begin{cases} x = 3t \\ y = 1 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

(b) On cherche le projeté orthogonal H de E sur d :

$$3 \times 3t - (1 - t) = 1 \iff t = \frac{1}{5}$$

Donc $H \left(\frac{3}{5}; \frac{4}{5} \right)$

(c) Ainsi $\text{dist}(E, d) = \overrightarrow{EH} \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} \end{pmatrix}$ et donc $\|\overrightarrow{EH}\| = \frac{1}{5} \sqrt{3^2 + (-1)^2} = \frac{\sqrt{10}}{5}$

4 Équation de cercle

22 $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 5^2 \iff x^2 - 6x + 9 + y^2 - 8y + 16 = 25 \iff x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$

23

$$1. x^2 + y^2 + 6x - 2y + 8 = 0 \iff (x+3)^2 - 9 + (y-1)^2 - 1 + 8 = 0 \iff (x+3)^2 + (y-1)^2 = 2$$

L'ensemble est le cercle de centre $\Omega(-3; 1)$ et de rayon $\sqrt{2}$.

$$2. x^2 + y^2 - \frac{1}{2}x + y + 1 = 0 \iff \left(x - \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{16} + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + 1 = 0 \iff \left(x - \frac{1}{4}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = -\frac{11}{16}$$

Il n'y a donc aucun point du plan qui vérifie l'équation initiale. On dit que l'ensemble des points est l'ensemble vide : \emptyset .

24 Centre $\Omega(3; 4)$, rayon 5.

Axe des abscisses : $y = 0$, pour trouver les intersections, on résout le système

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0 \\ y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 - 6x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

les deux solutions sont $\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 6 \end{cases}$

Axe des ordonnées : $x = 0$, pour trouver les intersections, on résout le système

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0 \\ x = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y^2 - 8y = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

les deux solutions sont $\begin{cases} y_1 = 0 \\ y_2 = 8 \end{cases}$

25 Système non linéaire, résolution par **substitution** :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 4x + 4y - 17 = 0 \\ x - 2y + 3 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 4y^2 - 12y + 9 + y^2 + 8y - 12 + 4y - 17 = 0 \\ x = 2y - 3 \end{cases} \iff \begin{cases} 5y^2 - 20 = 0 \\ x = 2y - 3 \end{cases}$$

Ainsi, les deux intersections sont : $I(-7; -2)$ et $J(1; 2)$.

26 L'équation du cercle est : $x^2 + y^2 - 6x - 2y = 0$. Le système est :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 6x - 2y = 0 \\ x + y - 2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 + y^2 - 6x - 2y = 0 \\ x = 2 - y \end{cases} \iff \begin{cases} 4 - 4y + y^2 + y^2 - 12 + 6y - 2y = 0 \\ x = 2 - y \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} 2y^2 - 8 = 0 \\ x = 2 - y \end{cases} \iff \begin{cases} y = \pm 2 \\ x = 2 - y \end{cases} \iff I(0; 2) \text{ et } J(4; -2) \text{ sont les intersections}$$