

## Devoir surveillé n° 7

### CORRIGÉ

#### Exercice 1.

1. Comme  $0 + 0 = 0 + 0 = 0$ ,  $0_{\mathbb{R}^4}$  appartient à  $F$ . Soient  $u = (x_1, y_1, z_1, t_1)$  et  $v = (x_2, y_2, z_2, t_2)$  dans  $F$  et  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ . Alors  $\lambda u + \mu v = (\underbrace{\lambda x_1 + \mu x_2}_x, \underbrace{\lambda y_1 + \mu y_2}_y, \underbrace{\lambda z_1 + \mu z_2}_z, \underbrace{\lambda t_1 + \mu t_2}_t)$ , et :

$$x - y = (\lambda x_1 + \mu x_2) - (\lambda y_1 + \mu y_2) = \lambda(x_1 - y_1) + \mu(x_2 - y_2) = 0,$$

$$z - t = (\lambda z_1 + \mu z_2) - (\lambda t_1 + \mu t_2) = \lambda(z_1 - t_1) + \mu(z_2 - t_2) = 0,$$

donc  $\lambda u + \mu v \in F$ . Donc  $F$  est stable par combinaison linéaire : c'est donc un sous-espace vectoriel de  $E$ .

2. Soit  $u = (x, y, z, t)$  dans  $E$ . On a :

$$u \in F \cap G \Leftrightarrow x - y = z - t = x - z = y - t = 0 \Leftrightarrow x = y = z = t \Leftrightarrow u = (x, x, x, x) = x(1, 1, 1, 1),$$

donc  $F \cap G = \text{Vect}((1, 1, 1, 1))$ . En particulier,  $F$  et  $G$  ne sont pas en somme directe, donc ne sont pas supplémentaires dans  $E$ .

3. Comme  $0 - 0 = 1 - 1 = 0$ ,  $u \in G$ , et comme  $0 - 1 \neq 0$ ,  $u \notin F$ , donc  $u \in G \setminus F$ . Supposons qu'il

existe  $f = (a, a, b, b) \in F$  et  $g = (c, d, c, d) \in G$  tels que  $v = f + g$ , alors : 
$$\left\{ \begin{array}{l} a + c = 1 \\ a + d = 2 \\ b + c = 3 \\ b + d = 0 \end{array} \right. , \text{ donc}$$

$a + b + c + d = 2 + 3 = 1 + 0$ , ce qui est impossible. Donc  $v \notin F + G$ .

Comme  $u, v \notin F$ ,  $F \cap H = \{0_E\}$ . Montrons d'autre part que  $F + H = E$ . Soit  $w = (x, y, z, t) \in E$  et  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ , on a :

$$\begin{aligned} w = f + \lambda u + \mu v &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a + \mu = x \\ a + \lambda + 2\mu = y \\ b + 3\mu = z \\ b + \lambda = t \end{array} \right. \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a + \mu = x \\ \lambda + \mu = y - x \\ b + 3\mu = z \\ \lambda - 3\mu = t - z \end{array} \right. \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a + \mu = x \\ \lambda = -\frac{3}{4}(x - y) - \frac{1}{4}(z - t) \\ b + 3\mu = z \\ \mu = -\frac{1}{4}(x - y) + \frac{1}{4}(z - t) \end{array} \right. \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = \frac{1}{4}(5x - y - z + t) \\ \lambda = \frac{1}{4}(-3x + 3y - z + t) \\ b = \frac{1}{4}(3x - 3y + z + 3t) \\ \mu = \frac{1}{4}(-x + y + z - t) \end{array} \right. , \end{aligned}$$

donc  $w$  admet une décomposition (unique) selon  $F$  et  $H$ . Donc  $F + H = E$ , donc  $F$  et  $H$  sont supplémentaires dans  $E$ .

4. D'après le résultat précédent, on a  $w = (a, a, b, b) + \lambda u + \mu v$  avec  $a = \frac{1}{4}(5 \times 0 - 1 + 2 - 5) = -1$ , et de même  $b = -5$ ,  $\lambda = 0$ ,  $\mu = 1$ . Donc  $w = (-1, -1, -5, -5) + v$ .

## Exercice 2.

1. (a) La fonction exponentielle est bien dérivable sur  $\mathbb{R}$ . Soit  $x \in \mathbb{R}^*$ . D'après le théorème des accroissements finis :  $e^{c_x} = \frac{e^x - e^0}{x}$ , donc  $c_x = \ln \left( \frac{e^x - 1}{x} \right)$ .

On sait que  $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^2)$ , donc  $\frac{e^x - 1}{x} = 1 + \frac{x}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x)$ .

Donc  $c_x = \ln \left( 1 + \frac{x}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x) \right) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x}{2}$ , d'où  $\frac{c_x}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} \frac{1}{2}$ .

- (b) La fonction arctan est bien dérivable sur  $\mathbb{R}$ . Soit  $x \in \mathbb{R}^*$ . D'après le théorème des accroissements finis :  $\frac{1}{1 + c_x^2} = \frac{\arctan(x) - \arctan(0)}{x}$ , donc  $c_x = \pm \sqrt{\frac{x}{\arctan(x)} - 1}$ .

On a :  $\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + o_{x \rightarrow 0}(x^3)$ , donc  $\frac{x}{\arctan(x)} = \frac{1}{1 - \frac{x^2}{3} + o_{x \rightarrow 0}(x^2)} = 1 + \frac{x^2}{3} + o_{x \rightarrow 0}(x^2)$ .

Donc  $c_x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x}{\sqrt{3}}$ , donc  $\frac{c_x}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} \frac{1}{\sqrt{3}}$ .

2. (a) Soit  $x \in I^*$ . La fonction  $f$  est de classe  $C^n$  sur  $I$ . On peut donc lui appliquer la formule de Taylor-Young à l'ordre  $n$  entre 0 et  $x$  :

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n),$$

donc

$$f'(c_x) = f'(0) + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^{n-1} + o_{x \rightarrow 0}(x^{n-1}).$$

Donc  $f'(c_x) - f'(0) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^{n-1}$ .

- (b) La fonction  $f'$  est de classe  $C^{n-1}$  sur  $I$ . On peut donc lui appliquer la formule de Taylor-Young à l'ordre  $n - 1$  entre 0 et  $x$  :

$$f'(x) = f'(0) + \frac{f^{(n)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1} + o_{x \rightarrow 0}(x^n),$$

donc  $f'(x) - f'(0) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{f^{(n)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1}$ .

- (c) Comme  $c_x \in ]0, x[$ , on a  $c_x \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} 0$ . Donc, d'après la question précédente :

$$f'(c_x) - f'(0) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{f^{(n)}(0)}{(n-1)!}c_x^{n-1}.$$

Comme d'autre part  $f'(c_x) - f'(0) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^{n-1}$ , on a :

$$\frac{f^{(n)}(0)}{(n-1)!}c_x^{n-1} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^{n-1},$$

d'où  $c_x^{n-1} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^{n-1}}{n}$ . Finalement :  $\frac{c_x}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} \frac{1}{n^{\frac{1}{n-1}}}$ .

### Exercice 3.

1. Soient  $u = (x_1, y_1, z_1) \in \mathbb{R}^3$  et  $v = (x_2, y_2, z_2) \in \mathbb{R}^3$  et  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ . On a :

$$\begin{aligned} f(\lambda u + \mu v) &= f(\lambda x_1 + \mu x_2, \lambda y_1 + \mu y_2, \lambda z_1 + \mu z_2) \\ &= (2(\lambda x_1 + \mu x_2) + (\lambda y_1 + \mu y_2) + (\lambda z_1 + \mu z_2), \\ &\quad (\lambda x_1 + \mu x_2) + 2(\lambda y_1 + \mu y_2) - (\lambda z_1 + \mu z_2), \\ &\quad (\lambda x_1 + \mu x_2) - (\lambda y_1 + \mu y_2) + 2(\lambda z_1 + \mu z_2)) \\ &= \lambda(2x_1 + y_1 + z_1, x_1 + 2y_1 - z_1, x_1 - y_1 + 2z_1) \\ &\quad + \mu(2x_2 + y_2 + z_2, x_2 + 2y_2 - z_2, x_2 - y_2 + 2z_2) \\ &= \lambda f(u) + \mu f(v), \end{aligned}$$

donc  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  est compatible avec la combinaison linéaire. Donc  $f$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$ .

2. Soit  $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ . On a :

$$\begin{aligned} f \circ f(u) &= f(2x + y + z, x + 2y - z, x - y + 2z) \\ &= (2(2x + y + z) + (x + 2y - z) + (x - y + 2z), \\ &\quad (2x + y + z) + 2(x + 2y - z) - (x - y + 2z), \\ &\quad (2x + y + z) - (x + 2y - z) + 2(x - y + 2z)) \\ &= (6x + 3y + 3z, 3x + 6y - 3z, 3x - 3y + 6z) \\ &= 3f(u), \end{aligned}$$

donc  $f \circ f = 3f$ .

3. Soit  $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ . On a :

•

$$\begin{aligned} u \in \text{Ker}(f) &\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y + z = 0 \\ x + 2y - z = 0 \\ x - y + 2z = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y + z = 0 \\ x + 2y - z = 0 \\ -3y + 3z = 0 \end{cases}, \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 0 = 0 \\ x = -z \\ y = z \end{cases} \\ &\Leftrightarrow u = (-z, z, z) = z(-1, 1, 1) \end{aligned}$$

donc la famille  $((-1, 1, 1))$  est génératrice de  $\text{Ker}(f)$ . Comme le vecteur  $(-1, 1, 1)$  est non nul, cette famille est également libre, donc est une base de  $\text{Ker}(f)$ .

•

$$\begin{aligned} f(u) &= (2x + y + z, x + 2y - z, x - y + 2z) \\ &= x(2, 1, 1) + y(1, 2, -1) + z(1, -1, 2), \end{aligned}$$

où  $(1, -1, 2) = (2, 1, 1) - (1, 2, -1)$ , donc la famille  $((2, 1, 1), (1, 2, -1))$  est génératrice de  $\text{Im}(f)$ . Comme les vecteurs  $(2, 1, 1)$  et  $(1, 2, -1)$  sont non colinéaires, cette famille est également libre, donc est une base de  $\text{Im}(f)$ .

4. D'après les calculs précédents :  $p \circ p = \frac{f \circ f}{3 \times 3} = \frac{3f}{9} = \frac{f}{3} = p$ , donc  $p$  est un projecteur de  $\mathbb{R}^3$ .

Comme  $\text{Ker} p = \text{Ker} f$  et  $\text{Im} p = \text{Im} f$ ,  $p$  est le projecteur sur le plan  $\text{Vect}((2, 1, 1), (1, 2, -1))$  parallèlement à la droite  $\text{Vect}((-1, 1, 1))$ .

## Problème.

I. 1. On a directement  $T_3(P_1) = P_1$  et  $T_3(P_2) = X^3$ , et :

$$\varphi(P_1) = (X + X^2)^2 - 3(X + X^2) + 1 = X^4 + 2X^3 + X^2 - 3X^2 - 3X + 1 = X^4 + 2X^3 - 2X^2 - 3X + 1,$$

$$\varphi(P_2) = (X + X^2)^5 + (X + X^2)^3 = X^{10} + 5X^9 + 10X^8 + 10X^7 + 5X^6 + X^5 + X^6 + 3X^5 + 3X^4 + X^3 = X^{10} + 5X^9 + 10X^8 + 10X^7 + 6X^6 + 4X^5 + 3X^4 + X^3.$$

2. i. Soit  $P = \sum_{k=0}^m a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$ . Alors  $T_n \circ T_n(P) = T_n \left( \sum_{k=0}^n a_k X^k \right) = \sum_{k=0}^n a_k X^k = T_n(P)$ , donc  $T_n$  est un projecteur.

ii. Soit  $P = \sum_{k=0}^m a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$ . On a :

$$P \in \text{Ker}(T_n) \Leftrightarrow \sum_{k=0}^n a_k X^k = 0_{\mathbb{R}[X]} \Leftrightarrow \forall k \leq n, a_k = 0 \Leftrightarrow P = \sum_{k=n+1}^m a_k X^k,$$

c'est-à-dire que  $G = \text{Ker}(T_n) = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid \forall k \leq n, a_k = 0\}$ .

De plus,  $T_n(P) \in \mathbb{R}_n[X]$ , donc  $F = \text{Im}(T_n) \subset \mathbb{R}_n[X]$ , et :  $\forall P \in \mathbb{R}_n[X]$ ,  $T_n(P) = P$ , donc  $P \in \text{Im}(T_n)$ . Donc  $F = \text{Im}(T_n) = \mathbb{R}_n[X]$ .  $T_n$  est donc le projecteur sur  $F$  parallèlement à  $G$ .

3. i. Soient  $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ , soient  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ . Alors  $\varphi(\lambda P + \mu Q) = (\lambda P + \mu Q)(X + X^2) = \lambda P(X + X^2) + \mu Q(X + X^2) = \lambda \varphi(P) + \mu \varphi(Q)$ , donc  $\varphi$  est une application linéaire.

ii. Soit  $n = \deg P$ , alors le terme dominant de  $P$  est de la forme  $a_n X^n$  où  $a_n \neq 0$ . Le terme dominant de  $\varphi(P)$  est alors celui de  $a_n (X + X^2)^n$ , c'est-à-dire  $a_n X^{2n}$ . Donc  $\deg(\varphi(P)) = 2n = 2 \deg(P)$ .

iii. Soit  $P \in \mathbb{R}[X]$ . Si  $P \neq 0_{\mathbb{R}[X]}$ , alors  $\deg(\varphi(P)) = 2 \deg(P) \in \mathbb{N}$ , donc  $\varphi(P) \neq 0_{\mathbb{R}[X]}$ . Donc  $\text{Ker}(\varphi) = \{0_{\mathbb{R}[X]}\}$ , donc  $\varphi$  est injective.

De plus, comme  $\deg(\varphi(P))$  est nécessairement pair,  $X^3$  n'a pas d'antécédent par  $\varphi$ . Donc  $\varphi$  n'est pas surjective.

II. 1. Comme  $\varphi_n = T_n \circ \varphi$ ,  $\varphi_n$  est linéaire car composée d'applications linéaires. De plus,  $\text{Im}(\varphi_n) \subset \text{Im}(T_n) \subset \mathbb{R}_n[X]$ , donc  $\varphi_n$  est bien un endomorphisme de  $\mathbb{R}_n[X]$ .

2. On a  $\varphi(1) = 1$ , donc  $\varphi_4(1) = 1$ ,

$$\varphi(X) = X^2 + X, \text{ donc } \varphi_4(X) = X^2 + X,$$

$$\varphi(X^2) = X^4 + 2X^3 + X^2, \text{ donc } \varphi_4(X^2) = X^4 + 2X^3 + X^2,$$

$$\varphi(X^3) = X^6 + 3X^5 + 3X^4 + X^3, \text{ donc } \varphi_4(X^3) = 3X^4 + X^3,$$

$$\varphi(X^4) = X^8 + 4X^7 + 6X^6 + 4X^5 + X^4, \text{ donc } \varphi_4(X^4) = X^4.$$

3. Soit  $P \in \mathbb{R}_4[X]$ . On a  $P \in \text{Ker}(\varphi_4) \Leftrightarrow T_4(\varphi(P)) = 0_{\mathbb{R}[X]} \Leftrightarrow \varphi(P) = 0_{\mathbb{R}[X]} \Leftrightarrow P = 0_{\mathbb{R}[X]}$ , d'après l'étude des noyaux de  $T_4$  et  $\varphi$ . Donc  $\varphi_4$  est injective.

On sait déjà que  $1 = \varphi_4(1)$  et que  $X^4 = \varphi_4(X^4)$ . On en déduit que :

$$X^3 = \varphi_4(X^3) - 3\varphi_4(X^4) = \varphi_4(X^3 - 3X^4), \text{ et :}$$

$$X^2 = \varphi_4(X^2) - \varphi_4(X^4) - 2\varphi_4(X^3 - 3X^4) = \varphi_4(5X^4 - 2X^3 + X^2), \text{ puis :}$$

$$X = \varphi_4(X) - \varphi_4(5X^4 - 2X^3 + X^2) = \varphi_4(-5X^4 + 2X^3 - X^2 + X).$$

Donc la base canonique de  $\mathbb{R}_4[X]$  appartient à  $\text{Im}(\varphi_4)$ , donc  $\varphi_4$  est surjective.

Donc  $\varphi_4$  est un automorphisme de  $\mathbb{R}_4[X]$ .

Sa réciproque est déterminée par :

$$\varphi_4^{-1}(X^4) = X^4, \quad \varphi_4^{-1}(X^3) = -3X^4 + X^3, \quad \varphi_4^{-1}(X^2) = 5X^4 - 2X^3 + X^2,$$

$$\varphi_4^{-1}(X) = -5X^4 + 2X^3 - X^2 + X, \quad \varphi_4^{-1}(1) = 1.$$

III. 1. La fonction  $f$  admet un développement limité d'ordre  $n$  en 0 par composition de développements limités, de partie régulière  $\varphi_n(P)$ .

2. La partie régulière du développement limité de  $g : x \mapsto \ln(1+x)$  est  $P = X - \frac{X^2}{2} + \frac{X^3}{3} - \frac{X^4}{4}$ .

On a alors :

$$\begin{aligned} \varphi_4(P) &= \varphi_4(X) - \frac{1}{2}\varphi_4(X^2) + \frac{1}{3}\varphi_4(X^3) - \frac{1}{4}\varphi_4(X^4) \\ &= (X^2 + X) - \frac{1}{2}(X^4 + 2X^3 + X^2) + \frac{1}{3}(3X^4 + X^3) - \frac{1}{4}X^4 \\ &= X + \frac{X^2}{2} - \frac{2}{3}X^3 + \frac{X^4}{4}. \end{aligned}$$

On a donc :  $f(x) = x + \frac{x^2}{2} - \frac{2}{3}x^3 + \frac{x^4}{4} + o_{x \rightarrow 0}(x^4)$ .

3. Le calcul est similaire.